

# Instructions d'utilisation FRAP® BLOCK

## TABLEAU DES USAGES

| Organisme cible                            | Dose par poste d'appâtage | Distance minimale entre 2 postes d'appâtage |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>EN INTERIEUR</b>                        |                           |                                             |
| <b>Souris</b>                              | <b>jusqu'à 50 g</b>       | <b>1 mètre</b>                              |
| <b>Rat Brun, Rat noir</b>                  | <b>jusqu'à 200 g</b>      | <b>4 mètres</b>                             |
| <b>EN EXTERIEUR (autour des bâtiments)</b> |                           |                                             |
| <b>Rat Brun, Rat noir</b>                  | <b>jusqu'à 200 g</b>      | <b>4 mètres</b>                             |

## SPECIFIQUE DE L'USAGE EN EXTERIEUR (AUTOUT DES BÂTIMENTS)

- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

## AVANT UTILISATION

- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple)
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par ex céréales éparpillées ou des déchets alimentaires).
- Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant les appâts
- Ne pas manger, boire ni fumer lors de l'utilisation du produit
- Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit

## POSITIONNER LE PRODUIT

- L'appât est prêt à l'emploi est à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisé.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc...).
- Les postes d'appâtage doivent si possible être fixés au sol ou à d'autres structures
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés au minimum tous les 5 à 7 jours (rats) et tous les 2 à 3 jours (souris) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.

## APRES UTILISATION

- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.